

2024년도 상반기 수산용 동물용의약(외)품 품목 허가·변경 현황

구분	제품명	효능 및 효과	용법 및 용량	유효 성분량	업 체 명 휴약기간	비 고
항생· 항균제	대 페니콜 산 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -항어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 100g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	100g /kg	대한뉴팜(주) 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·항어:30일 무지개송어:15일	허가
	GD- 린코마이신 100산 (린코마이신)	○ 린코마이신에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:연쇄구균증(<i>Streptococcus iniae</i> , <i>S. parauberis</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 100g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	100g(역가) /kg	(주)우성양행 넙치 25일	허가
	수산용 메켄 200액 (플루메켄)	○ 플루메켄에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어:질창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -넙치·참돔·항어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>)	○ 경구 -송어:어체중 톤 당 60~100ml(역가 12~20g) 3~7일 투여 -넙치·조피볼락·참돔·항어: 어체중 톤 당 100ml(역가 20g) 1일 1회, 7일 투여	200g /L	(주)중앙바이오텍 송어:8일 넙치:30일 조피볼락·참돔:5일 항어:21일	허가
	옥시펜타 (옥시테트라 사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어(연어과어류):아기미부식병(<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 질창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병(<i>Hamphillus piscium</i>), 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas sp.</i>) -잉어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병(<i>Aeromonas hydrophila</i>) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>) -메기:세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas sp.</i>) -뱅장어:지느러미적병(<i>Aeromonas punctata</i>) -참돔:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>)	○ 경구(어체중 톤 당, 사료혼합) -참돔:비브리오병(20~100g, 3~7일) -뱅장어:지느러미적병(20~100g, 3~7일) -메기:슈도모나스증·세균성출혈성패혈증(110~165g, 10일) -방어:유결절증(60~140g, 5일) -잉어:비브리오병(20~100g, 3~7일) -잉어:솔방울병(100~200g, 5일) -송어:질창병·궤양병·세균성출혈성패혈증·슈도모나스병(110~165g, 10일) -송어:비브리오병(20~100g, 3~7일) -송어:아가미부식병(165g, 10일) ○ 약욕(물 톤 당) -참돔:비브리오병(50g, 30~60분)	500g(역가) /kg	(주)제일바이오 송어:30일 잉어:25일 방어:20일 메기:30일 뱅장어:30일 참돔:20일 (약욕시 5일)	허가
	지안세프아쿠아 (세프티오퍼 나트륨) * 수입품	○ 세프티오퍼에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -넙치:연쇄구균증(<i>Streptococcus iniae</i> , <i>S. parauberis</i>)	○ 주사 -어체중 kg 당 0.2ml(역가 10mg) 1일 1회 근육주사 (*본제 1g(역가)당 주사용수 20ml로 비율 희석)	1,000mg(역가) /g	(주)지안바이오 넙치:7일	허가
	진우 아쿠아 에리셀파 -골드(산) (에리스로마이신 티오시아네이트)	○ 에리스로마이신·설파디아진·트리메토프림 합제에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -조피볼락:연쇄구균증(<i>Streptococcus sp.</i>), 비브리오병(<i>Vibrio ordalii</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 본제 100~200g으로 1일 1회, 3일간 투여	180g(역가) /kg	진우약품(주) 조피볼락:45일	허가
	진우 클린다마이신 -200(산) (클린다마이신 염산염)	○ 클린다마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -넙치·뱅장어:연쇄구균증(<i>Streptococcus sp.</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 25~50g(역가 5~10g) 1일 1~2회, 3일 투여	200g /kg	진우약품(주) 넙치:13일 뱅장어:15일	허가

GD-에리스라피 (에리스로마이신 타요사이네이트등)	○ 에리스로마이신 · 설파디아진 · 트리메토프림 합제에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -조피볼락: 연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.), 비브리오병(<i>Vibrio ordalii</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 본제 100~200g으로 1일 1회, 3일간 투여	180g(역가) /kg	(주)우성양행 조피볼락:45일	변경
GD-에리스로 (에리스로마이신)	○ 에리스로마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -무지개송어:연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.) -방어:연쇄구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 125-200g/일(역가 25~40g) 1일 1회, 5일 투여	200g(역가) /kg	(주)우성양행 무지개송어:30일 방어:14일	변경
GD-프로액 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 50ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	200g(역가) /L	(주)우성양행 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경
GD-플로린 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 200g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	50g(역가) /kg	(주)우성양행 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경
GD-플로린 액 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 50ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	200g /L	에스비신일(주) 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경
GD-플루메켄 (플루메켄)	○ 플루메켄에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어:질창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -넙치·참돔·향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>)	○ 경구 -송어:어체중 톤 당 24~40g(역가 12~20g) 3~7일 투여 -넙치·조피볼락·참돔·향어: 어체중 톤 당 40g(역가 20g) 1일 1회, 7일 투여	500g /kg	(주)우성양행 송어:8일 넙치:30일 조피볼락·참돔:5일 향어:21일	변경
GD-플루메켄 액 (플루메켄)	○ 플루메켄에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어:질창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -넙치·참돔·향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>)	○ 경구 -송어:어체중 톤 당 60~100ml(역가 12~20g) 3~7일 투여 -넙치·조피볼락·참돔·향어: 어체중 톤 당 100ml(역가 20g) 1일 1회, 7일 투여	200g /L	에스비신일(주) 송어:8일 넙치:30일 조피볼락·참돔:5일 향어:21일	변경
그린펜 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 400g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	25g(역가) /kg	(주)알앤엘애니멀헬스 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경

그린플로펜 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 400g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	25g /kg	제이비바이오팜(주) 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경
그린플로펜액 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 50ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	200g /L	제이비바이오팜(주) 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경
넬-에리셀팜 수산용 (에리스로마이신 티오시아네이트)	○ 에리스로마이신·셀파디아진·트리메토프림 합제에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -조피볼락: 연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.), 비브리오병(<i>Vibrio ordalii</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 본제 100~200g으로 1일 1회, 3일간 투여	180g(역가) /kg	(주)넬바이오텍 조피볼락:45일	변경
뉴마이신 수산용 (플루메퀸)	○ 플루메퀸에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어:절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -넙치·참돔·향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>)	○ 경구 -송어:어체중 톤 당 60~100g(역가 12~20g) 3~7일 투여 -넙치·조피볼락·참돔·향어: 어체중 톤 당 100g(역가 20g) 1일 1회, 7일 투여	200g /kg	(주)고려비엔피 송어:8일 넙치:30일 조피볼락·참돔:5일 향어:21일	변경
다원 이마이신 (에리스로마이신 티오시아네이트)	○ 에리스로마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -무지개송어:연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.) -방어:연쇄구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 125-200g/일(역가 25~40g) 1일 1회, 5일 투여	200g(역가) /kg	(주)다원케미칼 무지개송어:30일 방어:14일	변경
대성 아쿠아 지마이신 산 (에리스로마이신 티오시아네이트)	○ 에리스로마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -무지개송어:연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.) -방어:연쇄구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 125-200g/일(역가 25~40g) 1일 1회, 5일 투여	200g(역가) /kg	(주)대성미생물연구소 무지개송어:30일 방어:14일	변경
대성 아쿠아 클릭 산 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 200g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	50g /kg	(주)대성미생물연구소 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경
대성 아쿠아 클릭(액) (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 200ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	50g /L	(주)대성미생물연구소 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경

대성 아쿠아 플루메퀀씨 산 (플루메퀀)	○ 플루메퀀에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어:질창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -넙치·참돔·향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>)	○ 경구 -송어:어체중 톤 당 100~170g(역가 12~20g) 3~7일 투여 -넙치·조피볼락·참돔·향어: 어체중 톤 당 170g(역가 20g) 1일 1회, 7일 투여	120g /kg	(주)대성미생물연구소 송어:8일 넙치:30일 조피볼락·참돔:5일 향어:21일	변경
대한 아쿠아 에리셀팜 (에리스로마이신 티오시아네이트)	○ 에리스로마이신·설파디아진·트리메토프림 합제에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -조피볼락:연쇄상구균증(<i>Streptococcus</i> sp.), 비브리오병(<i>Vibrio ordalii</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 본제 100~200g으로 1일 1회, 3일간 투여	180g(역가) /kg	대한뉴팜(주) 조피볼락:45일	변경
로렉신 양어용 (플루메퀀)	○ 플루메퀀에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어:질창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -넙치·참돔·향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>)	○ 경구 -송어:어체중 톤 당 48~80ml(역가 12~20g) 3~7일 투여 -넙치·조피볼락·참돔·향어: 어체중 톤 당 80ml(역가 20g) 1일 1회, 7일 투여	250g /L	녹십자수의약품(주) 송어:8일 넙치:30일 조피볼락·참돔:5일 향어:21일	변경
로메킬-50 수산용 (플루메퀀)	○ 플루메퀀에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어:질창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -넙치·참돔·향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>)	○ 경구 -송어:어체중 톤 당 24~40g(역가 12~20g) 3~7일 투여 -넙치·조피볼락·참돔·향어: 어체중 톤 당 40g(역가 20g) 1일 1회, 7일 투여	500g /kg	(주)제일바이오 송어:8일 넙치:30일 조피볼락·참돔:5일 향어:21일	변경
로알플로 50 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 200g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	50g /kg	대한뉴팜(주) 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경
메가펜 아쿠아 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 200g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	50g /kg	(주)삼우메디안 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경
메가펜 아쿠아-10 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 100g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	100g /kg	(주)삼우메디안 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경
메가펜 피쉬 액 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 200ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	50g /L	(주)삼우메디안 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경

메가펜 피쉬 액 200g (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱀장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -항어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 50ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	200g /L	쭈상우메디안 넙치:21일 뱀장어:60일 농어:9일 조피볼락·항어:30일 무지개송어:15일	변경
메가펜 피쉬-10 액 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱀장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -항어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 100ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	100g /L	쭈상우메디안 넙치:21일 뱀장어:60일 농어:9일 조피볼락·항어:30일 무지개송어:15일	변경
삼양 수산용 옥소린 산 (옥소린산 나트륨)	○ 옥소린산에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱀장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 에로모나스병(지느러미적병: <i>Aeromonas hydrophila</i>), 적점병(<i>Pseudomonas anguilliseptica</i>) -은어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -잉어:에로모나스병(<i>Aeromonas</i> spp.) -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구(어체중 톤 당) -송어·연어:비브리오병(25~100g,3~5일), 절창병(25~50g,5~7일) -방어:유결절증(50~150g,5일) -뱀장어:에드워드병(25~100g,5~7일), 에로모나스병(25~100g,4~6일), 적점병(5~25g,3~5일) -은어:비브리오병(25~100g,3~7일) -잉어:에로모나스병(25~50g,5~7일) -넙치:에드워드병(150g(옥소린산 30g),7일) -조피볼락:비브리오병(150g(옥소린산 30g),7일)	200g(역가) /kg	쭈상양애니팜 송어·연어:21일 방어:16일 뱀장어:25일 은어:14일 잉어:28일 넙치·조피볼락:30일	변경
삼양 에리셀파 산 (에리스로마이신 티오시아네이트)	○ 에리스로마이신·설파디아진·트리메토프림 합제에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -조피볼락:연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.), 비브리오병(<i>Vibrio ordalii</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 본제 100~200g으로 1일 1회, 3일간 투여	180g(역가) +150g(역가) +30g(역가) /kg	쭈상양애니팜 조피볼락:45일	변경
삼양 에리스로 마이신 산 (에리스로마이신 티오시아네이트)	○ 에리스로마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -무지개송어:연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.) -방어:연쇄구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 125~200g/일(역가 25~40g) 5일 투여	200g(역가) /kg	쭈상양애니팜 무지개송어:30일 방어:14일	변경
삼우 옥소린-비 산 (옥소린산)	○ 옥소린산에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱀장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 에로모나스병(지느러미적병: <i>Aeromonas hydrophila</i>), 적점병(<i>Pseudomonas anguilliseptica</i>) -은어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -잉어:에로모나스병(<i>Aeromonas</i> spp.) -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구(어체중 톤 당) -송어·연어:비브리오병(25~100g,3~5일), 절창병(25~50g,5~7일) -방어:유결절증(50~150g,5일) -뱀장어:에드워드병(25~100g,5~7일), 에로모나스병(25~100g,4~6일), 적점병(5~25g,3~5일) -은어:비브리오병(25~100g,3~7일) -잉어:에로모나스병(25~50g,5~7일) -넙치:에드워드병(150g(옥소린산 30g),7일) -조피볼락:비브리오병(150g(옥소린산 30g),7일)	200g /kg	쭈상우메디안 송어·연어:21일 방어:16일 뱀장어:25일 은어:14일 잉어:28일 넙치·조피볼락:30일	변경
삼우 타일로신 아쿠아 산 (타일로신 타르타르산염)	○ 타일로신에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:연쇄구균증(<i>Streptococcus parauberis</i> S. <i>iniae</i>) -강도다리:연쇄구균증(<i>S. parauberis</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 100g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	100g(역가) /kg	쭈상우메디안 넙치:20일 강도다리:28일	변경

삼우 푸루메킨 리퀴드 (플루메퀸)	○ 플루메퀸에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어:절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -넙치·참돔·향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>)	○ 경구 -송어:어체중 톤 당 48~80ml(역가 12~20g) 3~7일 투여 -넙치·조피볼락·참돔·향어: 어체중 톤 당 80ml(역가 20g) 1일 1회, 7일 투여	250g /L	㈜삼우메디안 송어:8일 넙치:30일 조피볼락·참돔:5일 향어:21일	변경
삼우 푸루메킨 아쿠아 (플루메퀸)	○ 플루메퀸에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어:절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -넙치·참돔·향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>)	○ 경구 -송어:어체중 톤 당 100~170g(역가 12~17g) 3~7일 투여 -넙치·조피볼락·참돔·향어: 어체중 톤 당 167g(역가 20g) 1일 1회, 7일 투여	120g /kg	㈜삼우메디안 송어:8일 넙치:30일 조피볼락·참돔:5일 향어:21일	변경
성원 수산용 다노펜 플러스 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 200g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	50g /kg	㈜성원 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경
성원 양어용 다나펜-C (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 400g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	25g /kg	㈜성원 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경
성원 에리스로 200 (에리스로마이신 티오시아네이트)	○ 에리스로마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -무지개송어:연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.) -방어:연쇄구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 125~200g/일(역가 25~40g) 1일 1회, 5일 투여	200g(역가) /kg	㈜삼양애니팜 무지개송어:30일 방어:14일	변경
성원 옥소리 (옥소리산 나트륨)	○ 옥소리산에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 에로모나스병(지느러미적병: <i>Aeromonas hydrophila</i>), 적점병(<i>Pseudomonas anguilliseptica</i>) -은어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -잉어:에로모나스병(<i>Aeromonas</i> spp.) -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구(어체중 톤 당) -송어·연어:비브리오병(25~100g,3~5일), 절창병(25~50g,5~7일) -방어:유결절증(50~150g,5일) -뱅장어:에드워드병(25~100g,5~7일), 에로모나스병(25~100g,4~6일), 적점병(5~25g,3~5일) -은어:비브리오병(25~100g,3~7일) -잉어:에로모나스병(25~50g,5~7일) -넙치:에드워드병(150g(옥소리산 30g),7일) -조피볼락:비브리오병(150g(옥소리산 30g),7일)	200g(역가) /kg	㈜삼양애니팜 송어·연어:21일 방어:16일 뱅장어:25일 은어:14일 잉어:28일 넙치·조피볼락:30일	변경
성원 플루메퀸 (플루메퀸)	○ 플루메퀸에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어:절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -넙치·참돔·향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>)	○ 경구 -송어:어체중 톤 당 120~200g(역가 12~20g) 3~7일 투여 -넙치·조피볼락·참돔·향어: 어체중 톤 당 200g(역가 20g) 1일 1회, 7일 투여	100g /kg	㈜성원 송어:8일 넙치:30일 조피볼락·참돔:5일 향어:21일	변경

(수산용)홀록소린 (옥소리산)	○ 옥소리산에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 질창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 에로모나스병(지느러미적병:<i>Aeromonas hydrophila</i>), 적점병(<i>Pseudomonas anguilliseptica</i>) -은어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -잉어:에로모나스병(<i>Aeromonas</i> spp.) -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구(어체중 톤 당) -송어·연어:비브리오병(25~100g,3~5일), 질창병(25~50g,5~7일) -방어:유결절증(50~150g,5일) -뱅장어:에드워드병(25~100g,5~7일), 에로모나스병(25~100g,4~6일), 적점병(5~25g,3~5일) -은어:비브리오병(25~100g,3~7일) -잉어:에로모나스병(25~50g,5~7일) -넙치:에드워드병(150g(옥소리산 30g),7일) -조피볼락:비브리오병(150g(옥소리산 30g),7일)	200g /kg	(주)우성양행 송어·연어:21일 방어:16일 뱅장어:25일 은어:14일 잉어:28일 넙치·조피볼락:30일	변경
수산용 나미퀸 (플루메퀸)	○ 플루메퀸에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어:질창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -넙치·참돔·향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>)	○ 경구 -송어:어체중 톤 당 120~200g(역가 12~20g) 3~7일 투여 -넙치·조피볼락·참돔·향어: 어체중 톤 당 200g(역가 20g) 1일 1회, 7일 투여	100g(역가) /kg	이화팜텍(주) 송어:8일 넙치:30일 조피볼락·참돔:5일 향어:21일	변경
수산용 녹수 옥소리 (옥소리산 나트륨)	○ 옥소리산에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 질창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 에로모나스병(지느러미적병:<i>Aeromonas hydrophila</i>), 적점병(<i>Pseudomonas anguilliseptica</i>) -은어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -잉어:에로모나스병(<i>Aeromonas</i> spp.) -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구(어체중 톤 당) -송어·연어:비브리오병(20~80g,3~5일), 질창병(20~40g,5~7일) -방어:유결절증(40~120g,5일) -뱅장어:에드워드병(20~80g,5~7일), 에로모나스병(20~80g,4~6일), 적점병(4~20g,3~5일) -은어:비브리오병(20~80g,3~7일) -잉어:에로모나스병(20~40g,5~7일) -넙치:에드워드병(120g(옥소리산 30g),7일) -조피볼락:비브리오병(120g(옥소리산 30g),7일)	250g /kg	녹십자수의약품(주) 송어·연어:21일 방어:16일 뱅장어:25일 은어:14일 잉어:28일 넙치·조피볼락:30일	변경
수산용 녹수테트라산-500 (옥시테트라 사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어(연어과어류):아가미부식병(<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 질창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>), 폐양병(<i>Haemophilus piscium</i>), 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas</i> <i>liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas</i> sp.) -잉어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병(<i>Aeromonas hydrophila</i>) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>) -메기:세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas</i> sp.) -뱅장어:지느러미적병(<i>Aeromonas punctata</i>) -참돔:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>)	○ 경구(어체중 톤 당, 사료혼합) -참돔:비브리오병(20~100g,3~7일) -뱅장어:지느러미적병(20~100g,3~7일) -메기:슈도모나스·세균성출혈성패혈증 (110~165g,10일) -방어:유결절증(60~140g,5일) -잉어:비브리오병(20~100g,3~7일) -잉어:솔방울병(100~200g,5일) -송어:질창병·폐양병·세균성출혈성패혈증· 슈도모나스병(110~165g,10일) -송어:비브리오병(20~100g,3~7일) -송어:아가미부식병(165g,10일) ○ 약욕(물 톤 당) -참돔:비브리오병(50g,30~60분)	500g(역가) /kg	녹십자수의약품(주) 송어:30일 잉어:25일 방어:20일 메기:30일 뱅장어:30일 참돔:20일 (약욕시 5일)	변경
수산용 다노펜20액 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 50ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	200g /L	(주)성원 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경

수산물 다노펜액 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -항어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 100ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	100g /L	㈜성원 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·항어:30일 무지개송어:15일	변경
수산물 더블 에리스라 산 (에리스로마이신 타요시나이드)	○ 에리스로마이신·설파디아진·트리메토프림 합제에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -조피볼락:연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.), 비브리오병(<i>Vibrio ordalii</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 본제 100~200g으로 1일 1회, 3일간 투여	180g+150g+30g /kg	(주)중앙바이오텍 조피볼락:45일	변경
수산물 레스플로 200액 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -항어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 50ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	200g /L	㈜성원 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·항어:30일 무지개송어:15일	변경
수산물 삼양 타일로신 산 (타일로신 타르타르산염)	○ 타일로신에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:연쇄구균증(<i>Streptococcus parva</i> S. <i>iniae</i>) -강도다리:연쇄구균증(<i>S. parva</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 100g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	100g(역가) /kg	㈜삼양애니팜 넙치:20일 강도다리:28일	변경
수산물 삼우 옥소리산 (옥소리산 나트륨)	○ 옥소리산에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 질창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 에로모나스병(지느러미적병: <i>Aeromonas hydrophila</i>), 적점병(<i>Pseudomonas anguilliseptica</i>) -은어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -잉어:에로모나스병(<i>Aeromonas</i> spp.) -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구(어체중 톤 당) -송어·연어:비브리오병(25~100g, 3~5일), 질창병(25~50g, 5~7일) -방어:유결절증(50~150g, 5일) -뱅장어:에드워드병(25~100g, 5~7일), 에로모나스병(25~100g, 4~6일), 적점병(5~25g, 3~5일) -은어:비브리오병(25~100g, 3~7일) -잉어:에로모나스병(25~50g, 5~7일) -넙치:에드워드병(150g(옥소리산 30g), 7일) -조피볼락:비브리오병(150g(옥소리산 30g), 7일)	230g /kg	㈜삼우메디안 송어·연어:21일 방어:16일 뱅장어:25일 은어:14일 잉어:28일 넙치·조피볼락:30일	변경
수산물 셀파에림 산 (에리스로마이신 타요시나이드)	○ 에리스로마이신·설파디아진·트리메토프림 합제에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -조피볼락:연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.), 비브리오병(<i>Vibrio ordalii</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 본제 100~200g으로 1일 1회, 3일간 투여	180g(역가) /kg	이화팜텍(주) 조피볼락:45일	변경
수산물 슈퍼플로 100액 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -항어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 100ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	100g /L	㈜이글벳 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·항어:30일 무지개송어:15일	변경

수산용 슈퍼플로 200액 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -황어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 50ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	200g /L	쭈이글벵 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·황어:30일 무지개송어:15일	변경
수산용 아목센(쭈) (아목시실린 나트륨)	○ 아목시실린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -넙치:연쇄구균증(<i>Streptococcus iniae</i> , <i>S. parauberis</i>)	○ 주사 -어체중 kg 당 0.4ml(역가 40mg) 1일 1회 등근육 주사	1,000mg(역가) /1.2g	우진비앤지(쭈) 넙치:20일	변경
수산용 아이메퀀액 (플루메퀀)	○ 플루메퀀에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어:절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -넙치·참돔·황어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>)	○ 경구 -송어:어체중 톤 당 48~80ml(역가 12~20g) 3~7일 투여 -넙치·조피볼락·참돔·황어: 어체중 톤 당 80ml(역가 20g) 1일 1회, 7일 투여	250g /L	쭈아이앤팜 송어:8일 넙치:30일 조피볼락·참돔:5일 황어:21일	변경
수산용 암펜(쭈) (암피실린 나트륨)	○ 암피실린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -넙치:연쇄구균증(<i>Streptococcus iniae</i> , <i>S. parauberis</i>)	○ 주사 -어체중 kg 당 0.2ml(역가 20mg) 1일 1회 등근육 주사	1,000mg(역가) /g	우진비앤지(쭈) 넙치:20일	변경
수산용 애니헬 에리셀프 (에리스로마이신 티오시아네이트)	○ 에리스로마이신·설파디아진·트리메토프림 합제에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -조피볼락:연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.), 비브리오병(<i>Vibrio ordalii</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 본제 100~200g으로 1일 1회, 3일간 투여	180g(역가) +150g(역가) /kg	제이비바이오팜(쭈) 조피볼락:45일	변경
수산용 애드 에리셀파름 산 (에리스로마이신 티오시아네이트)	○ 에리스로마이신·설파디아진·트리메토프림 합제에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -조피볼락:연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.), 비브리오병(<i>Vibrio ordalii</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 본제 100~200g으로 1일 1회, 3일간 투여	180g(역가) /kg	쭈애드바이오텍 조피볼락:45일	변경
수산용 애드 옥소리너블 산 (옥소리산)	○ 옥소리산에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 에로모나스병(지느러미적병: <i>Aeromonas hydrophila</i>), 적점병(<i>Pseudomonas anguilliseptica</i>) -은어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -잉어:에로모나스병(<i>Aeromonas</i> spp.) -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구(어체중 톤 당) -송어·연어:비브리오병(25~100g, 3~5일), 절창병(25~50g, 5~7일) -방어:유결절증(50~150g, 5일) -뱅장어:에드워드병(25~100g, 5~7일), 에로모나스병(25~100g, 4~6일), 적점병(5~25g, 3~5일) -은어:비브리오병(25~100g, 3~7일) -잉어:에로모나스병(25~50g, 5~7일) -넙치:에드워드병(150g(옥소리산 30g), 7일) -조피볼락:비브리오병(150g(옥소리산 30g), 7일)	200g /kg	쭈애드바이오텍 송어·연어:21일 방어:16일 뱅장어:25일 은어:14일 잉어:28일 넙치·조피볼락:30일	변경
수산용 애드 플로르 100 액 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -황어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 100ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	100g /L	쭈애드바이오텍 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·황어:30일 무지개송어:15일	변경

수산물 애드 플로르 50 산 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -항어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 200g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	50g /kg	(주)애드바이오텍 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·항어:30일 무지개송어:15일	변경
수산물 에리셀파 (에리스로마이신 티오시아네이트등)	○ 에리스로마이신·설파디아진·트리메토프림 합제에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -조피볼락:연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.), 비브리오병(<i>Vibrio ordalii</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 본제 200~400g으로 1일 1회, 3일간 투여	90g(역가) +75g(역가) /kg	(주)중앙바이오텍 조피볼락:45일	변경
수산물 에리셀프림 (에리스로마이신 티오시아네이트등)	○ 에리스로마이신·설파디아진·트리메토프림 합제에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -조피볼락:연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.), 비브리오병(<i>Vibrio ordalii</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 본제 100~200g으로 1일 1회, 3일간 투여	180g(역가) /kg	(주)다원케미칼 조피볼락:45일	변경
수산물 에리스로 (에리스로마이신 티오시아네이트)	○ 에리스로마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -무지개송어:연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.) -방어:연쇄구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 125-200g/일(역가 25~40g) 1일 1회, 5일 투여	200g(역가) /kg	(주)퓨오바이더스 무지개송어:30일 방어:14일	변경
수산물 에리스로마이신 (에리스로마이신 티오시아네이트)	○ 에리스로마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -무지개송어:연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.) -방어:연쇄구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 125-200g/일(역가 25~40g) 1일 1회, 5일 투여	100g(역가) /kg	(주)서울신약 무지개송어:30일 방어:14일	변경
수산물 에리스로산 (에리스로마이신 티오시아네이트)	○ 에리스로마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -무지개송어:연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.) -방어:연쇄구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 125-200g/일(역가 25~40g) 1일 1회, 5일 투여	200g(역가) /kg	(주)삼우메디안 무지개송어:30일 방어:14일	변경
수산물 에리스로-콤비 (에리스로마이신 티오시아네이트등)	○ 에리스로마이신·설파디아진·트리메토프림 합제에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -조피볼락:연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.), 비브리오병(<i>Vibrio ordalii</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 본제 100~200g으로 1일 1회, 3일간 투여	180g(역가) /kg	(주)한동 조피볼락:45일	변경
수산물 에리신 (에리스로마이신 티오시아네이트)	○ 에리스로마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -무지개송어:연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.) -방어:연쇄구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 125-200g/일(역가 25~40g) 1일 1회, 5일 투여	200g(역가) /kg	(주)고려비엔피 무지개송어:30일 방어:14일	변경
수산물 에리예스티 (에리스로마이신 티오시아네이트등)	○ 에리스로마이신·설파디아진·트리메토프림 합제에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -조피볼락:연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.), 비브리오병(<i>Vibrio ordalii</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 본제 100~200g으로 1일 1회, 3일간 투여	180g(역가) +150g(역가) /kg	(주)서울신약 조피볼락:45일	변경
수산물 에리트 (에리스로마이신 티오시아네이트등)	○ 에리스로마이신·설파디아진·트리메토프림 합제에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -조피볼락:연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.), 비브리오병(<i>Vibrio ordalii</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 본제 100~200g으로 1일 1회, 3일간 투여	180g(역가) /kg	(주)성원 조피볼락:45일	변경

수산용 에스트림산 (에리스로마이신 티오시아네이트)	○ 에리스로마이신 · 설파디아진 · 트리메토프림 합제에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -조피볼락: 연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.), 비브리오병(<i>Vibrio ordalii</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 본제 200~400g으로 1일 1회, 3일간 투여	90g(역가) /kg	(주)고려비엔피 조피볼락:45일	변경
수산용 옥소리-200 (옥소리산)	○ 옥소리산에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어 · 연어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 질창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱀장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 에로모나스병(지느러미적병: <i>Aeromonas hydrophila</i>), 적점병(<i>Pseudomonas anguilliseptica</i>) -은어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -잉어:에로모나스병(<i>Aeromonas</i> spp.) -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구(어체중 톤 당) -송어 · 연어:비브리오병(25~100g,3~5일), 질창병(25~50g,5~7일) -방어:유결절증(50~150g,5일) -뱀장어:에드워드병(25~100g,5~7일), 에로모나스병(25~100g,4~6일), 적점병(5~25g,3~5일) -은어:비브리오병(25~100g,3~7일) -잉어:에로모나스병(25~50g,5~7일) -넙치:에드워드병(150g(옥소리산 30g),7일) -조피볼락:비브리오병(150g(옥소리산 30g),7일)	200g /kg	(주)퓨오바이더스 송어 · 연어:21일 방어:16일 뱀장어:25일 은어:14일 잉어:28일 넙치 · 조피볼락:30일	변경
수산용 옥소리산 (옥소리산 나트륨)	○ 옥소리산에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어 · 연어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 질창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱀장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 에로모나스병(지느러미적병: <i>Aeromonas hydrophila</i>), 적점병(<i>Pseudomonas anguilliseptica</i>) -은어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -잉어:에로모나스병(<i>Aeromonas</i> spp.) -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구(어체중 톤 당) -송어 · 연어:비브리오병(25~100g,3~5일), 질창병(25~50g,5~7일) -방어:유결절증(50~150g,5일) -뱀장어:에드워드병(25~100g,5~7일), 에로모나스병(25~100g,4~6일), 적점병(5~25g,3~5일) -은어:비브리오병(25~100g,3~7일) -잉어:에로모나스병(25~50g,5~7일) -넙치:에드워드병(150g(옥소리산 30g),7일) -조피볼락:비브리오병(150g(옥소리산 30g),7일)	200g /kg	(주)한동 송어 · 연어:21일 방어:16일 뱀장어:25일 은어:14일 잉어:28일 넙치 · 조피볼락:30일	변경
수산용 옥소리톤 (옥소리산)	○ 옥소리산에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어 · 연어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 질창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱀장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 에로모나스병(지느러미적병: <i>Aeromonas hydrophila</i>), 적점병(<i>Pseudomonas anguilliseptica</i>) -은어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -잉어:에로모나스병(<i>Aeromonas</i> spp.) -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구(어체중 톤 당) -송어 · 연어:비브리오병(20~80g,3~5일), 질창병(20~40g,5~7일) -방어:유결절증(40~120g,5일) -뱀장어:에드워드병(20~80g,5~7일), 에로모나스병(20~80g,4~6일), 적점병(4~20g,3~5일) -은어:비브리오병(20~80g,3~7일) -잉어:에로모나스병(20~40g,5~7일) -넙치:에드워드병(120g(옥소리산 30g),7일) -조피볼락:비브리오병(120g(옥소리산 30g),7일)	250g /kg	우진비앤지(주) 송어 · 연어:21일 방어:16일 뱀장어:25일 은어:14일 잉어:28일 넙치 · 조피볼락:30일	변경
수산용 이마이신 (에리스로마이신 티오시아네이트)	○ 에리스로마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -무지개송어:연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.) -방어:연쇄구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 125-200g/일(역가 25~40g) 1일 1회, 5일 투여	200g(역가) /kg	(주)중앙바이오텍 무지개송어:30일 방어:14일	변경
수산용 참신 에리마이신 (에리스로마이신 티오시아네이트)	○ 에리스로마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -무지개송어:연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.) -방어:연쇄구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 250-400g/일(역가 25~40g) 1일 1회, 5일 투여	100g(역가) /kg	(주)참신홀딩스 무지개송어:30일 방어:14일	변경
수산용 참신 에리시노트림 (에리스로마이신 티오시아네이트)	○ 에리스로마이신 · 설파디아진 · 트리메토프림 합제에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -조피볼락: 연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.), 비브리오병(<i>Vibrio ordalii</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 본제 100~200g으로 1일 1회, 3일간 투여	180g(역가) /kg	(주)참신홀딩스 조피볼락:45일	변경

수산물 참신 옥소린 (옥소린산)	○ 옥소린산에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱀장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 에로모나스병(지느러미적병: <i>Aeromonas hydrophila</i>), 적점병(<i>Pseudomonas anguilliseptica</i>) -은어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -잉어:에로모나스병(<i>Aeromonas</i> spp.) -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구(어체중 톤 당) -송어·연어:비브리오병(25~100g,3~5일), 절창병(25~50g,5~7일) -방어:유결절증(50~150g,5일) -뱀장어:에드워드병(25~100g,5~7일), 에로모나스병(25~100g,4~6일), 적점병(5~25g,3~5일) -은어:비브리오병(25~100g,3~7일) -잉어:에로모나스병(25~50g,5~7일) -넙치:에드워드병(150g(옥소린산 30g),7일) -조피볼락:비브리오병(150g(옥소린산 30g),7일)	200g(역가) /kg	㈜참신홀딩스 송어·연어:21일 방어:16일 뱀장어:25일 은어:14일 잉어:28일 넙치·조피볼락:30일	변경
수산물 참신 플루메퀸 (플루메퀸)	○ 플루메퀸에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어:절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -넙치·참돔·항어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>)	○ 경구 -송어:어체중 톤 당 120~200g(역가 12~20g) 3~7일 투여 -넙치·조피볼락·참돔·항어: 어체중 톤 당 200g(역가 20g) 1일 1회, 7일 투여	100g /kg	㈜참신홀딩스 송어:8일 넙치:30일 조피볼락·참돔:5일 항어:21일	변경
수산물 참신 플루메퀸 액제 (플루메퀸)	○ 플루메퀸에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어:절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -넙치·참돔·항어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>)	○ 경구 -송어:어체중 톤 당 60~100ml(역가 12~20g) 3~7일 투여 -넙치·조피볼락·참돔·항어: 어체중 톤 당 100ml(역가 20g) 1일 1회, 7일 투여	200g /L	㈜참신홀딩스 송어:8일 넙치:30일 조피볼락·참돔:5일 항어:21일	변경
수산물 타이로 100산 (타일로신 타르타르산염)	○ 타일로신에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:연쇄구균증(<i>Streptococcus parauberis</i> S. <i>iniae</i>) -강도다리:연쇄구균증(<i>S. parauberis</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 100g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	100g(역가) /kg	㈜중앙바이오텍 넙치:20일 강도다리:28일	변경
수산물 타이로 200산 (타일로신 타르타르산염)	○ 타일로신에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:연쇄구균증(<i>Streptococcus parauberis</i> S. <i>iniae</i>) -강도다리:연쇄구균증(<i>S. parauberis</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 50g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	200g(역가) /kg	㈜중앙바이오텍 넙치:20일 강도다리:28일	변경
수산물 타이로킹 100 산 (타일로신 타르타르산염)	○ 타일로신에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:연쇄구균증(<i>Streptococcus parauberis</i> S. <i>iniae</i>) -강도다리:연쇄구균증(<i>S. parauberis</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 100g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	100g(역가) /kg	㈜한풍산업 넙치:20일 강도다리:28일	변경
수산물 타이산-100 (산) (타일로신 타르타르산염)	○ 타일로신에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:연쇄구균증(<i>Streptococcus parauberis</i> S. <i>iniae</i>) -강도다리:연쇄구균증(<i>S. parauberis</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 100g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	100g(역가) /kg	진우약품㈜ 넙치:20일 강도다리:28일	변경
수산물 타이산-200 (산) (타일로신 타르타르산염)	○ 타일로신에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:연쇄구균증(<i>Streptococcus parauberis</i> S. <i>iniae</i>) -강도다리:연쇄구균증(<i>S. parauberis</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 50g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	200g(역가) /kg	진우약품㈜ 넙치:20일 강도다리:28일	변경
수산물 타일로피쉬 산 (타일로신 타르타르산염)	○ 타일로신에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:연쇄구균증(<i>Streptococcus parauberis</i> S. <i>iniae</i>) -강도다리:연쇄구균증(<i>S. parauberis</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 100g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	100g(역가) /kg	㈜한동 넙치:20일 강도다리:28일	변경
수산물 티로신 100 수용산 (타일로신 타르타르산염)	○ 타일로신에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:연쇄구균증(<i>Streptococcus parauberis</i> S. <i>iniae</i>) -강도다리:연쇄구균증(<i>S. parauberis</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 100g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	100g(역가) /kg	에스비신일㈜ 넙치:20일 강도다리:28일	변경

수산용 파라잔 (옥소리산)	○ 옥소리산에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 질창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱀장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 에로모나스병(지느러미적병: <i>Aeromonas hydrophila</i>), 적점병(<i>Pseudomonas anguilliseptica</i>) -은어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -잉어:에로모나스병(<i>Aeromonas</i> spp.) -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구(어체중 톤 당) -송어·연어:비브리오병(25~100g, 3~5일), 질창병(25~50g, 5~7일) -방어:유결절증(50~150g, 5일) -뱀장어:에드워드병(25~100g, 5~7일), 에로모나스병(25~100g, 4~6일), 적점병(5~25g, 3~5일) -은어:비브리오병(25~100g, 3~7일) -잉어:에로모나스병(25~50g, 5~7일) -넙치:에드워드병(150g(옥소리산 30g), 7일) -조피볼락:비브리오병(150g(옥소리산 30g), 7일)	200g /kg	(주)에스에프 송어·연어:21일 방어:16일 뱀장어:25일 은어:14일 잉어:28일 넙치·조피볼락:30일	변경
수산용 페니솔 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱀장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 50ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	200g(역가) /L	(주)창신희딩스 넙치:21일 뱀장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경
수산용 페니콜 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱀장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 400g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	25g /kg	(주)창신희딩스 넙치:21일 뱀장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경
수산용 펜콜 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱀장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 400g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	25g /kg	(주)고려비엔피 넙치:21일 뱀장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경
수산용 펜플로엑 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 50ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	20g /L	녹십자수의약품(주) 넙치:21일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경
수산용 프로페니산 50g (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱀장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 200g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	50g(역가) /kg	(주)아이애펜팜 넙치:21일 뱀장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경

수산용 프로페니액 200g (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -항어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 50ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	200g(역가) /L	(주)아이애파 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·항어:30일 무지개송어:15일	변경
수산용 플로르 100 액 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -항어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 100ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	100g(역가) /L	(주)한풍산업 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·항어:30일 무지개송어:15일	변경
수산용 플로르 200 액 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -항어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 50ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	200g(역가) /L	(주)한풍산업 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·항어:30일 무지개송어:15일	변경
수산용 플로르펜 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -항어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 400g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	25g /kg	(주)퓨오바이더스 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·항어:30일 무지개송어:15일	변경
수산용 플로르펜 10%액 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -항어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 100ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	100g /L	(주)퓨오바이더스 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·항어:30일 무지개송어:15일	변경
수산용 플로르펜 20% 액제 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -항어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 50ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	200g /L	(주)퓨오바이더스 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·항어:30일 무지개송어:15일	변경
수산용 플로르펜 50 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -항어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 200g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	50g /kg	(주)퓨오바이더스 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·항어:30일 무지개송어:15일	변경

수산용 플로릭스산 50g (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 200g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	50g /kg	㈜중앙바이오텍 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경
수산용 플로콜(액)-100 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 100ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	100g /L	진우약품㈜ 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경
수산용 플로콜(액)-200 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 50ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	200g /L	진우약품㈜ 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경
수산용 후루메퀀 산 (플루메퀀)	○ 플루메퀀에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어:질창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -넙치·참돔·향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>)	○ 경구 -송어:어체중 톤 당 120~200g(역가 12~20g) 3~7일 투여 -넙치·조피볼락·참돔·향어:어체중 톤 당 200g(역가 20g) 1일 1회, 7일 투여	100g /kg	㈜삼양애니팜 송어:8일 넙치:30일 조피볼락·참돔:5일 향어:21일	변경
수산용 후루퀀 (플루메퀀)	○ 플루메퀀에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어:질창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -넙치·참돔·향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>)	○ 경구 -송어:어체중 톤 당 120~200g(역가 12~20g) 3~7일 투여 -넙치·조피볼락·참돔·향어:어체중 톤 당 200g(역가 20g) 1일 1회, 7일 투여	100g /kg	한국쌍빈㈜ 송어:8일 넙치:30일 조피볼락·참돔:5일 향어:21일	변경
수산용 휘쉬-옥소린 (옥소린산 나트륨)	○ 옥소린산에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 질창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 에로모나스병(지느러미적병: <i>Aeromonas hydrophila</i>), 적점병(<i>Pseudomonas anguilliseptica</i>) -은어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -잉어:에로모나스병(<i>Aeromonas</i> spp.) -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구(어체중 톤 당) -송어·연어:비브리오병(25~100g, 3~5일), 질창병(25~50g, 5~7일) -방어:유결절증(50~150g, 5일) -뱅장어:에드워드병(25~100g, 5~7일), 에로모나스병(25~100g, 4~6일), 적점병(5~25g, 3~5일) -은어:비브리오병(25~100g, 3~7일) -잉어:에로모나스병(25~50g, 5~7일) -넙치:에드워드병(150g(옥소린산 30g), 7일) -조피볼락:비브리오병(150g(옥소린산 30g), 7일)	200g /kg	㈜유니바이오테크 송어·연어:21일 방어:16일 뱅장어:25일 은어:14일 잉어:28일 넙치·조피볼락:30일	변경
수산용 에리스로마이신 (에리스로마이신)	○ 에리스로마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -무지개송어:연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.) -방어:연쇄구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 250~400g/일(역가 25~40g) 1일 1회, 5일 투여	100g(역가) /kg	㈜에스에프 무지개송어:30일 방어:14일	변경
수산용-유니 타이로 100산 (타일로신 타르타르산염)	○ 타일로신에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:연쇄구균증(<i>Streptococcus parauberis</i> S. <i>iniae</i>) -강도다리:연쇄구균증(<i>S. parauberis</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 100g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	100g(역가) /kg	㈜유니바이오테크 넙치:20일 강도다리:28일	변경

수산전용 에리설트림 (에리스로마이신 티오시아네이트)	○ 에리스로마이신 · 설파디아진 · 트리메토프림 합제에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -조피볼락: 연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.), 비브리오병(<i>Vibrio ordalii</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 본제 100~200g으로 1일 1회, 3일간 투여	180g(역가) /kg	썬이글벵 조피볼락:45일	변경
슈퍼 펜콜액 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱀장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -항어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 50ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	200g /L	대한뉴팜(썬) 넙치:21일 뱀장어:60일 농어:9일 조피볼락·항어:30일 무지개송어:15일	변경
아쿠아 에리스로 (에리스로마이신 티오시아네이트)	○ 에리스로마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -무지개송어:연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.) -방어:연쇄구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 125-200g/일(역가 25~40g) 1일 1회, 5일 투여	200g(역가) /kg	이화팜텍(썬) 무지개송어:30일 방어:14일	변경
아쿠아 에리스로킹 (에리스로마이신 티오시아네이트)	○ 에리스로마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -무지개송어:연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.) -방어:연쇄구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 125-200g/일(역가 25~40g) 1일 1회, 5일 투여	200g(역가) /kg	대한뉴팜(썬) 무지개송어:30일 방어:14일	변경
아쿠아 옥소린-100(산) (옥소린산)	○ 옥소린산에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱀장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 에로모나스병(지느러미적병: <i>Aeromonas hydrophila</i>), 적점병(<i>Pseudomonas anguilliseptica</i>) -은어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -잉어:에로모나스병(<i>Aeromonas</i> spp.) -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구(어체중 톤 당) -송어·연어:비브리오병(50~200g,3~5일), 절창병(50~100g,5~7일) -방어:유결절증(100~200g,5일) -뱀장어:에드워드병(50~200g,5~7일), 에로모나스병(50~200g,4~6일), 적점병(10~50g,3~5일) -은어:비브리오병(50~200g,3~7일) -잉어:에로모나스병(50~100g,5~7일) -넙치:에드워드병(300g(옥소린산 30g),7일) -조피볼락:비브리오병(300g(옥소린산 30g),7일)	100g /kg	진우약품(썬) 송어·연어:21일 방어:16일 뱀장어:25일 은어:14일 잉어:28일 넙치·조피볼락:30일	변경
아쿠아 옥소린-200(산) (옥소린산)	○ 옥소린산에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱀장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 에로모나스병(지느러미적병: <i>Aeromonas hydrophila</i>), 적점병(<i>Pseudomonas anguilliseptica</i>) -은어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -잉어:에로모나스병(<i>Aeromonas</i> spp.) -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구(어체중 톤 당) -송어·연어:비브리오병(25~100g,3~5일), 절창병(25~50g,5~7일) -방어:유결절증(50~150g,5일) -뱀장어:에드워드병(25~100g,5~7일), 에로모나스병(25~100g,4~6일), 적점병(5~25g,3~5일) -은어:비브리오병(25~100g,3~7일) -잉어:에로모나스병(25~50g,5~7일) -넙치:에드워드병(150g(옥소린산 30g),7일) -조피볼락:비브리오병(150g(옥소린산 30g),7일)	200g /kg	진우약품(썬) 송어·연어:21일 방어:16일 뱀장어:25일 은어:14일 잉어:28일 넙치·조피볼락:30일	변경
아쿠아 옥솔 (옥소린산)	○ 옥소린산에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱀장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 에로모나스병(지느러미적병: <i>Aeromonas hydrophila</i>), 적점병(<i>Pseudomonas anguilliseptica</i>) -은어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -잉어:에로모나스병(<i>Aeromonas</i> spp.) -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구(어체중 톤 당) -송어·연어:비브리오병(25~100g,3~5일), 절창병(25~50g,5~7일) -방어:유결절증(50~150g,5일) -뱀장어:에드워드병(25~100g,5~7일), 에로모나스병(25~100g,4~6일), 적점병(5~25g,3~5일) -은어:비브리오병(25~100g,3~7일) -잉어:에로모나스병(25~50g,5~7일) -넙치:에드워드병(150g(옥소린산 30g),7일) -조피볼락:비브리오병(150g(옥소린산 30g),7일)	200g /kg	썬서울신약 송어·연어:21일 방어:16일 뱀장어:25일 은어:14일 잉어:28일 넙치·조피볼락:30일	변경

아쿠아 옥스-200 (옥소리산)	○ 옥소리산에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 질창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 에로모나스병(지느러미적병:<i>Aeromonas hydrophila</i>), 적점병(<i>Pseudomonas anguilliseptica</i>) -은어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -잉어:에로모나스병(<i>Aeromonas</i> spp.) -납치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구(어체중 톤 당) -송어·연어:비브리오병(25~100g, 3~5일), 질창병(25~50g, 5~7일) -방어:유결절증(50~150g, 5일) -뱅장어:에드워드병(25~100g, 5~7일), 에로모나스병(25~100g, 4~6일), 적점병(5~25g, 3~5일) -은어:비브리오병(25~100g, 3~7일) -잉어:에로모나스병(25~50g, 5~7일) -납치:에드워드병(150g(옥소리산 30g), 7일) -조피볼락:비브리오병(150g(옥소리산 30g), 7일)	200g /kg	대한뉴팜(주) 송어·연어:21일 방어:16일 뱅장어:25일 은어:14일 잉어:28일 납치·조피볼락:30일	변경
아쿠아 파워콜엑 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -납치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 100ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	100g /L	대한뉴팜(주) 납치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경
아쿠아 플루엑 (플루메렌)	○ 플루메렌에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어:질창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -납치·참돔·향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>)	○ 경구 -송어:어체중 톤 당 120~200g(역가 12~20g) 3~7일 투여 -납치·조피볼락·참돔·향어:어체중 톤 당 200g(역가 20g) 1일 1회, 7일 투여	100g /kg	대한뉴팜(주) 송어:8일 납치:30일 조피볼락·참돔:5일 향어:21일	변경
아쿠아콜 100 엑 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -납치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 100ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	100g /L	(주)상양애니팜 납치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경
아쿠아콜 200 엑 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -납치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 50ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	200g /L	(주)상양애니팜 납치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경
아쿠아콜 산 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -납치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 200g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	50g /kg	(주)상양애니팜 납치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경

아쿠아퀸 (플루메퀸)	○ 플루메퀸에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어:질창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -넙치·참돔·향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>)	○ 경구 -송어:어체중 톤 당 100~170g(역가 12~20g) 3~7일 투여 -넙치·조피볼락·참돔·향어: 어체중 톤 당 170g(역가 20g) 1일 1회, 7일 투여	120g /kg	쭈서울신약 송어:8일 넙치:30일 조피볼락·참돔:5일 향어:21일	변경
아쿠아파워콜 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 400g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	25g /kg	대한뉴팜(주) 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경
아쿠아플로 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 400g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	25g /kg	쭈이글벳 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경
아쿠아플로액 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 500ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	20g /L	쭈이글벳 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경
아쿠아플로콜 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 400g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	25g /kg	쭈에스에프 넙치:21일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경
아쿠플로액 100 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 100ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	100g /L	이화팜텍(주) 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경
아쿠플로액 200 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 50ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	200g /L	이화팜텍(주) 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경

양어용 에리스로마이신 (에리스로마이신 티오시아네이트)	○ 에리스로마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -무지개송어:연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.) -방어:연쇄구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 125-200g/일(역가 25~40g) 1일 1회, 5일 투여	200g(역가) /kg	㈜이글벳 무지개송어:30일 방어:14일	변경
에리·에스 아쿠아 (에리스로마이신 티오시아네이트)	○ 에리스로마이신·설파디아진·트리메토프림 합제에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -조피볼락:연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.), 비브리오병(<i>Vibrio ordalii</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 본제 100~200g으로 1일 1회, 3일간 투여	180g(역가) /kg	㈜삼우메디안 조피볼락:45일	변경
에리맥스-아쿠아 (에리스로마이신 티오시아네이트)	○ 에리스로마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -무지개송어:연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.) -방어:연쇄구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 125-200g/일(역가 25~40g) 1일 1회, 5일 투여	200g(역가) /kg	우진비앤지주 무지개송어:30일 방어:14일	변경
에리셀파 휘쉬 (에리스로마이신 티오시아네이트)	○ 에리스로마이신·설파디아진·트리메토프림 합제에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -조피볼락:연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.), 비브리오병(<i>Vibrio ordalii</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 본제 100~200g으로 1일 1회, 3일간 투여	180g(역가) /kg	한국썸벳(주) 조피볼락:45일	변경
에리파쉬 (에리스로마이신 티오시아네이트)	○ 에리스로마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -무지개송어:연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.) -방어:연쇄구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 125-200g/일(역가 25~40g) 1일 1회, 5일 투여	200g(역가) /kg	㈜제일바이오 무지개송어:30일 방어:14일	변경
에스에프 에리셀파 아쿠아 (에리스로마이신 티오시아네이트)	○ 에리스로마이신·설파디아진·트리메토프림 합제에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -조피볼락:연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.), 비브리오병(<i>Vibrio ordalii</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 본제 100~200g으로 1일 1회, 3일간 투여	180g(역가) /kg	㈜에스에프 조피볼락:45일	변경
옥소리린 수산용 (옥소리린산)	○ 옥소리린산에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 에로모나스병(지느러미적병: <i>Aeromonas hydrophila</i>), 적점병(<i>Pseudomonas anguilliseptica</i>) -은어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -잉어:에로모나스병(<i>Aeromonas</i> spp.) -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구(어체중 톤 당) -송어·연어:비브리오병(25~100g,3~5일), 절창병(25~50g,5~7일) -방어:유결절증(50~150g,5일) -뱅장어:에드워드병(25~100g,5~7일), 에로모나스병(25~100g,4~6일), 적점병(5~25g,3~5일) -은어:비브리오병(25~100g,3~7일) -잉어:에로모나스병(25~50g,5~7일) -넙치:에드워드병(150g(옥소리린산 30g),7일) -조피볼락:비브리오병(150g(옥소리린산 30g),7일)	200g /kg	한국썸벳(주) 송어·연어:21일 방어:16일 뱅장어:25일 은어:14일 잉어:28일 넙치·조피볼락:30일	변경
옥솔리파워 수용산 (옥소리린산나트륨)	○ 옥소리린산에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 에로모나스병(지느러미적병: <i>Aeromonas hydrophila</i>), 적점병(<i>Pseudomonas anguilliseptica</i>) -은어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -잉어:에로모나스병(<i>Aeromonas</i> spp.) -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구(어체중 톤 당) -송어·연어:비브리오병(25~100g,3~5일), 절창병(25~50g,5~7일) -방어:유결절증(50~150g,5일) -뱅장어:에드워드병(25~100g,5~7일), 에로모나스병(25~100g,4~6일), 적점병(5~25g,3~5일) -은어:비브리오병(25~100g,3~7일) -잉어:에로모나스병(25~50g,5~7일) -넙치:에드워드병(150g(옥소리린산 30g),7일) -조피볼락:비브리오병(150g(옥소리린산 30g),7일)	200g /kg	㈜넬바이오텍 송어·연어:21일 방어:16일 뱅장어:25일 은어:14일 잉어:28일 넙치·조피볼락:30일	변경
울트라 플루르 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -황어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 400g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	25g /kg	이화팜텍(주) 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·황어:30일 무지개송어:15일	변경

울트라 플로르 50 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -항어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 200g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	50g /kg	이화팜텍(주) 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·항어:30일 무지개송어:15일	변경
우진 타이거(산) (타일로신 타르타르산염)	○ 타일로신에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:연쇄구균증(<i>Streptococcus parauberis</i> S. <i>iniae</i>) -강도다리:연쇄구균증(<i>S. parauberis</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 100g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	100g(역가) /kg	우진비앤지(주) 넙치:20일 강도다리:28일	변경
이화 수산용 옥소리산 (옥소리산나트륨)	○ 옥소리산에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 에로모나스병(지느러미적병: <i>Aeromonas hydrophila</i>), 적점병(<i>Pseudomonas anguilliseptica</i>) -은어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -잉어:에로모나스병(<i>Aeromonas</i> spp.) -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구(어체중 톤 당) -송어·연어:비브리오병(21~83g, 3~5일), 절창병(21~42g, 5~7일) -방어:유결절증(42~125g, 5일) -뱅장어:에드워드병(21~83g, 5~7일), 에로모나스병(21~83g, 4~6일), 적점병(4~21g, 3~5일) -은어:비브리오병(21~83g, 3~7일) -잉어:에로모나스병(21~42g, 5~7일) -넙치:에드워드병(125g(옥소리산 30g), 7일) -조피볼락:비브리오병(125g(옥소리산 30g), 7일)	240g(역가) /kg	이화팜텍(주) 송어·연어:21일 방어:16일 뱅장어:25일 은어:14일 잉어:28일 넙치·조피볼락:30일	변경
제일 옥소리 수산용 (옥소리산)	○ 옥소리산에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 에로모나스병(지느러미적병: <i>Aeromonas hydrophila</i>), 적점병(<i>Pseudomonas anguilliseptica</i>) -은어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -잉어:에로모나스병(<i>Aeromonas</i> spp.) -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구(어체중 톤 당) -송어·연어:비브리오병(25~100g, 3~5일), 절창병(25~50g, 5~7일) -방어:유결절증(50~150g, 5일) -뱅장어:에드워드병(25~100g, 5~7일), 에로모나스병(25~100g, 4~6일), 적점병(5~25g, 3~5일) -은어:비브리오병(25~100g, 3~7일) -잉어:에로모나스병(25~50g, 5~7일) -넙치:에드워드병(150g(옥소리산 30g), 7일) -조피볼락:비브리오병(150g(옥소리산 30g), 7일)	200g /kg	㈜제일바이오 송어·연어:21일 방어:16일 뱅장어:25일 은어:14일 잉어:28일 넙치·조피볼락:30일	변경
제일 펜콜 200액 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -항어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 50ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	200g /L	㈜제일바이오 넙치:21일 조피볼락·항어:30일 무지개송어:15일	변경
중앙 옥술산 (옥소리산나트륨)	○ 옥소리산에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 에로모나스병(지느러미적병: <i>Aeromonas hydrophila</i>), 적점병(<i>Pseudomonas anguilliseptica</i>) -은어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -잉어:에로모나스병(<i>Aeromonas</i> spp.) -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구(어체중 톤 당) -송어·연어:비브리오병(25~100g, 3~5일), 절창병(25~50g, 5~7일) -방어:유결절증(50~150g, 5일) -뱅장어:에드워드병(25~100g, 5~7일), 에로모나스병(25~100g, 4~6일), 적점병(5~25g, 3~5일) -은어:비브리오병(25~100g, 3~7일) -잉어:에로모나스병(25~50g, 5~7일) -넙치:에드워드병(150g(옥소리산 30g), 7일) -조피볼락:비브리오병(150g(옥소리산 30g), 7일)	230g (200g(옥소리산)) /kg	㈜중앙바이오 송어·연어:21일 방어:16일 뱅장어:25일 은어:14일 잉어:28일 넙치·조피볼락:30일	변경

진우 아쿠아 에리스라 (에리스로마이신 티오시아네이트)	○ 에리스로마이신 · 셀파디아진 · 트리메토프림 합제에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -조피볼락: 연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.), 비브리오병(<i>Vibrio ordalii</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 본제 200~400g으로 1일 1회, 3일간 투여	90g(역가) /kg	진우약품(주) 조피볼락:45일	변경
진우 플로펜 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 200g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	50g /kg	진우약품(주) 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경
진우 에리스로 200 (에리스로마이신 티오시아네이트)	○ 에리스로마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -무지개송어:연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.) -방어:연쇄구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 125-200g/일(역가 25~40g) 5일 투여	200g(역가) /kg	진우약품(주) 무지개송어:30일 방어:14일	변경
참신 수산용 타일로100 수용산 (타일로신 타르타르산염)	○ 타일로신에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:연쇄구균증(<i>Streptococcus parauberis</i> S. <i>iniae</i>) -강도다리:연쇄구균증(<i>S. parauberis</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 100g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	100g(역가) /kg	주참신홀딩스 넙치:20일 강도다리:28일	변경
케이티엑스 아쿠아 산 (타일로신 타르타르산염)	○ 타일로신에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:연쇄구균증(<i>Streptococcus parauberis</i> S. <i>iniae</i>) -강도다리:연쇄구균증(<i>S. parauberis</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 100g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	100g(역가) /kg	주고려비엔피 넙치:20일 강도다리:28일	변경
티로 아쿠아 산 (타일로신 타르타르산염)	○ 타일로신에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:연쇄구균증(<i>Streptococcus parauberis</i> S. <i>iniae</i>) -강도다리:연쇄구균증(<i>S. parauberis</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 100g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	100g(역가) /kg	대한뉴팜(주) 넙치:20일 강도다리:28일	변경
파워마이신 (에리스로마이신 티오시아네이트)	○ 에리스로마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -무지개송어:연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.) -방어:연쇄구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 100~160g/일(역가 25~40g) 1일 1회, 5일 투여	250g(역가) /kg	한국쌍벚(주) 무지개송어:30일 방어:14일	변경
파워메켄 (플루메켄)	○ 플루메켄에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어:질창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -넙치·참돔·향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>)	○ 경구 -송어:어체중 톤 당 60~100ml(역가 12~20g) 3~7일 투여 -넙치·조피볼락·참돔·향어: 어체중 톤 당 100ml(역가 20g) 1일 1회, 7일 투여	200g /L	주넬바이오텍 송어:8일 넙치:30일 조피볼락·참돔:5일 향어:21일	변경
펜콜 아쿠아 주 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:연쇄구균증(<i>Streptococcus iniae</i> , <i>S. parauberis</i>), 에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 주사 -어체중 kg 당 0.1mL(역가 10mg) 1일 1회, 근육 주사	100.0mg /1mL	주고려비엔피 넙치:30일	변경
펜콜리퀴드A 200액 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 50ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	200g /L	주씨티씨바이오 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경

펜콜에프 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -황어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 200g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	50g /kg	(주)씨티씨바이오 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·황어:30일 무지개송어:15일	변경
푸른바다 옥소신 (옥소린산)	○ 옥소린산에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 에로모나스병(지느러미적병:<i>Aeromonas hydrophila</i>), 적점병(<i>Pseudomonas anguilliseptica</i>) -은어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -잉어:에로모나스병(<i>Aeromonas</i> spp.) -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구(어체중 톤 당) -송어·연어:비브리오병(25~100g,3~5일), 절창병(25~50g,5~7일) -방어:유결절증(50~150g,5일) -뱅장어:에드워드병(25~100g,5~7일), 에로모나스병(25~100g,4~6일), 적점병(5~25g,3~5일) -은어:비브리오병(25~100g,3~7일) -잉어:에로모나스병(25~50g,5~7일) -넙치:에드워드병(150g(옥소린산 30g),7일) -조피볼락:비브리오병(150g(옥소린산 30g),7일)	200g /kg	제이비바이오팜(주) 송어·연어:21일 방어:16일 뱅장어:25일 은어:14일 잉어:28일 넙치·조피볼락:30일	변경
푸른바다 에리신 (에리스로마이신 티오시아네이트)	○ 에리스로마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -무지개송어:연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.) -방어:연쇄구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 125-200g/일(역가 25~40g) 1일 1회, 5일 투여	200g(역가) /kg	제이비바이오팜(주) 무지개송어:30일 방어:14일	변경
푸른바다 플로신 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -황어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 400g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	25g /kg	제이비바이오팜(주) 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·황어:30일 무지개송어:15일	변경
푸른바다 플로신200액 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -황어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 50ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	200g /L	제이비바이오팜(주) 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·황어:30일 무지개송어:15일	변경
푸른바다 플로신50 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -황어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 200g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	50g /kg	제이비바이오팜(주) 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·황어:30일 무지개송어:15일	변경

프로마린 코미퀼 (플루메퀼)	○ 플루메퀼에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어:절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -넙치·참돔·항어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>)	○ 경구 -송어:어체중 톤 당 120~200g(역가 12~20g) 3~7일 투여 -넙치·조피볼락·참돔·항어: 어체중 톤 당 200g(역가 20g) 1일 1회, 7일 투여	100g /kg	㈜코미팜 송어:8일 넙치:30일 조피볼락·참돔:5일 항어:21일	변경
프로마린 코미퀼 액 (플루메퀼)	○ 플루메퀼에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어:절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -넙치·참돔·항어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>)	○ 경구 -송어:어체중 톤 당 48~80ml(역가 12~20g) 3~7일 투여 -넙치·조피볼락·참돔·항어: 어체중 톤 당 80ml(역가 20g) 1일 1회, 7일 투여	250g /L	㈜코미팜 송어:8일 넙치:30일 조피볼락·참돔:5일 항어:21일	변경
프로마린 플루스타 액 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -항어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 500ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	20g /L	㈜코미팜 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·항어:30일 무지개송어:15일	변경
프로페콜 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -항어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 400g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	25g /kg	한국쌍빈㈜ 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·항어:30일 무지개송어:15일	변경
플로르맥스 -아쿠아 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -항어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 100ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	100g /L	㈜제일바이오 넙치:21일 조피볼락·항어:30일 무지개송어:15일	변경
플로리산(수용액) (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -항어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 500g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	20g /kg	㈜이엘티사이언스 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·항어:30일 무지개송어:15일	변경
플로콜 피시 200액 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -항어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 50ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	200g(역가) /L	㈜서울신약 넙치:21일 조피볼락·항어:30일 무지개송어:15일	변경
플로콜 피시 300액 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -항어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 33.3ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	300g(역가) /L	㈜서울신약 넙치:21일 조피볼락·항어:30일 무지개송어:15일	변경

플로텍-아쿠아 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 400g(억가 10g) 1일 1회, 5일 투여	25g /kg	에스비신일쥬 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경
플로판-에프 수용산 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 400g(억가 10g) 1일 1회, 5일 투여	25g /kg	우진비앤지쥬 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경
플로피쉬 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 400g(억가 10g) 1일 1회, 5일 투여	25g /kg	쥬한동 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경
플로피쉬 100액 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 100ml(억가 10g) 1일 1회, 5일 투여	100g /L	쥬한동 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경
플로피쉬 골드 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 200g(억가 10g) 1일 1회, 5일 투여	50g /kg	쥬한동 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경
플루메퀀 액 250g (플루메퀀)	○ 플루메퀀에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어:질창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -넙치·참돔·향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>)	○ 경구 -송어:어체중 톤 당 48~80ml(억가 12~20g) 3~7일 투여 -넙치·조피볼락·참돔·향어: 어체중 톤 당 80ml(억가 20g) 1일 1회, 7일 투여	250g /L	쥬퓨오바이더스 송어:8일 넙치:30일 조피볼락·참돔:5일 향어:21일	변경
하이 플로펜 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 200g(억가 10g) 1일 1회, 5일 투여	50g /kg	쥬다원케이칼 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경

하이메켄 (플루메켄)	○ 플루메켄에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어:절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -넙치·참돔·향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>)	○ 경구 -송어:어체중 톤 당 120~200g(역가 12~20g) 3~7일 투여 -넙치·조피볼락·참돔·향어: 어체중 톤 당 200g(역가 20g) 1일 1회, 7일 투여	100g(역가) /kg	쥘다원케미칼 송어:8일 넙치:30일 조피볼락·참돔:5일 향어:21일	변경
하이메켄 C (플루메켄)	○ 플루메켄에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어:절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -넙치·참돔·향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>)	○ 경구 -송어:어체중 톤 당 100~170g(역가 12~20g) 3~7일 투여 -넙치·조피볼락·참돔·향어: 어체중 톤 당 170g(역가 20g) 1일 1회, 7일 투여	120g /kg	쥘다원케미칼 송어:8일 넙치:30일 조피볼락·참돔:5일 향어:21일	변경
하이메켄 10%액 (플루메켄)	○ 플루메켄에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어:절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -넙치·참돔·향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>)	○ 경구 -송어:어체중 톤 당 120~200ml(역가 12~20g) 3~7일 투여 -넙치·조피볼락·참돔·향어: 어체중 톤 당 200ml(역가 20g) 1일 1회, 7일 투여	100g(역가) /L	쥘다원케미칼 송어:8일 넙치:30일 조피볼락·참돔:5일 향어:21일	변경
하이메켄 20%액 (플루메켄)	○ 플루메켄에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어:절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -넙치·참돔·향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>)	○ 경구 -송어:어체중 톤 당 60~100ml(역가 12~20g) 3~7일 투여 -넙치·조피볼락·참돔·향어: 어체중 톤 당 100ml(역가 20g) 1일 1회, 7일 투여	200g(역가) /L	쥘다원케미칼 송어:8일 넙치:30일 조피볼락·참돔:5일 향어:21일	변경
하이옥소린 (옥소린산)	○ 옥소린산에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 에로모나스병(지느러미적병: <i>Aeromonas hydrophila</i>), 적점병(<i>Pseudomonas anguilliseptica</i>) -은어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -잉어:에로모나스병(<i>Aeromonas</i> spp.) -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구(어체중 톤 당) -송어·연어:비브리오병(25~100g, 3~5일), 절창병(25~50g, 5~7일) -방어:유결절증(50~150g, 5일) -뱅장어:에드워드병(25~100g, 5~7일), 에로모나스병(25~100g, 4~6일), 적점병(5~25g, 3~5일) -은어:비브리오병(25~100g, 3~7일) -잉어:에로모나스병(25~50g, 5~7일) -넙치:에드워드병(150g(옥소린산 30g), 7일) -조피볼락:비브리오병(150g(옥소린산 30g), 7일)	200g /kg	쥘다원케미칼 송어·연어:21일 방어:16일 뱅장어:25일 은어:14일 잉어:28일 넙치·조피볼락:30일	변경
하이타이로 100 산 (타일로신 타르타르산염)	○ 타일로신에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:연쇄구균증(<i>Streptococcus parauberis</i> S. iniae) -강도다리:연쇄구균증(<i>S. parauberis</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 100g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	100g(역가) /kg	쥘다원케미칼 넙치:20일 강도다리:28일	변경
하이플로펜 200액 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -향어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 50ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	200g /L	쥘다원케미칼 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·향어:30일 무지개송어:15일	변경

하이플로펜엑 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -항어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 100ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	100g /L	㈜다원케미칼 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·항어:30일 무지개송어:15일	변경
한동 에리스로-250 (에리스로마이신 티오시아네이트)	○ 에리스로마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -무지개송어:연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.) -방어:연쇄구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 100~160g/일(역가 25~40g) 1일 1회, 5일 투여	250g(역가) /kg	㈜한동 무지개송어:30일 방어:14일	변경
홀로콜 10%액-수산용 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -항어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 100ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	100g /L	㈜넬바이오텍 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·항어:30일 무지개송어:15일	변경
홀로콜 200액-수산용 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -항어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 50ml(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	200g /L	㈜넬바이오텍 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·항어:30일 무지개송어:15일	변경
홀로콜(어류용) (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -항어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 400g(역가 10g) 1일 1회, 5일 투여	25g /kg	㈜넬바이오텍 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·항어:30일 무지개송어:15일	변경
취쉬 옥소리산 200 (옥소리산)	○ 옥소리산에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 에로모나스병(지느러미적병: <i>Aeromonas hydrophila</i>), 적점병(<i>Pseudomonas anguilliseptica</i>) -은어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -잉어:에로모나스병(<i>Aeromonas</i> spp.) -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구(어체중 톤 당) -송어·연어:비브리오병(25~100g, 3~5일), 절창병(25~50g, 5~7일) -방어:유결절증(50~150g, 5일) -뱅장어:에드워드병(25~100g, 5~7일), 에로모나스병(25~100g, 4~6일), 적점병(5~25g, 3~5일) -은어:비브리오병(25~100g, 3~7일) -잉어:에로모나스병(25~50g, 5~7일) -넙치:에드워드병(150g(옥소리산 30g), 7일) -조피볼락:비브리오병(150g(옥소리산 30g), 7일)	200g /kg	㈜유니바이오텍 송어·연어:21일 방어:16일 뱅장어:25일 은어:14일 잉어:28일 넙치·조피볼락:30일	변경
취쉬스로 썬파 (에리스로마이신 티오시아네이트)	○ 에리스로마이신·설파디아진·트리메토프림 합제에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -조피볼락:연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.), 비브리오병(<i>Vibrio ordalii</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 본제 100~200g으로 1일 1회, 3일간 투여	180g(역가) /kg	㈜유니바이오텍 조피볼락:45일	변경

	휘쉬스로 에스 (에리스로마이신 티오시아네이트)	○ 에리스로마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -무지개송어:연쇄구균증(<i>Streptococcus</i> sp.) -방어:연쇄구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 125-200g/일(억가 25~40g) 1일 1회, 5일 투여	200g(억가) /kg	㈜유니바이오테크 무지개송어:30일 방어:14일	변경
	휘쉬플로100 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -황어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 100ml(억가 10g) 1일 1회, 5일 투여	100g /L	㈜유니바이오테크 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·황어:30일 무지개송어:15일	변경
	휘쉬플로200 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -황어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 50ml(억가 10g) 1일 1회, 5일 투여	200g /L	㈜유니바이오테크 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·황어:30일 무지개송어:15일	변경
	휘쉬-플로르 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus iniae</i>) -뱅장어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -농어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>), 연쇄상구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>) -황어:에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -무지개송어:에로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 400g(억가 10g) 1일 1회, 5일 투여	25g /kg	㈜유니바이오테크 넙치:21일 뱅장어:60일 농어:9일 조피볼락·황어:30일 무지개송어:15일	변경
	GD-타이론 100 산 (타일로신 타르타르산염)	○ 타일로신에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:연쇄구균증(<i>Streptococcus parauberis</i> S. iniae) -강도다리:연쇄구균증(S. parauberis)	○ 경구 -어체중 톤 당 100g(억가 10g) 1일 1회, 5일 투여	100g(억가) /kg	㈜우성양행 넙치:20일 강도다리:28일	조부 허가
구충제	네츄럴 스쿠치스탑 (추목피추출물)	○ 넙치: 스쿠티카충 감염증(<i>Scuticociliatosis</i>)의 경감 및 완화	○ 경구 -어체중 톤 당 본제 1L를 사료와 균일 혼합, 1일 1회, 2일 투여(필요시 1~2회 추가)	500ml (갈릭산 1,500mg) /L	㈜고려비엔피 -	허가
	수산용 참신 페반텔 산 (페반텔)	○ 페반텔에 감수성이 있는 기생충성 질병 치료 -조피볼락:아가미흡충증(<i>Microcotyle sebastis</i>) -복어류:아가미흡충증(<i>Heterobothrium okamotoi</i>)	○ 경구 -조피볼락:어체중 톤 당 2g(억가 50g) 1일 1회, 3일 투여 -복어류:어체중 톤 당 0.5~1kg(억가 12.5~25g) 1일 1회, 5일 투여	25g /kg	㈜참신힐딩스 조피볼락:24일 복 어 류:21일	허가
	수산용 펜벤다졸-10F 산 (펜벤다졸)	○ 펜벤다졸에 감수성이 있는 기생충성 질병 치료 -조피볼락:아가미흡충증(<i>Microcotyle sebastis</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 1kg(억가 100g) 1일 1회, 3일 투여	100g /kg	㈜이글벳 조피볼락:15일	허가
	수산용 펜벤큐어 산 (펜벤다졸)	○ 펜벤다졸에 감수성이 있는 기생충성 질병 치료 -조피볼락:아가미흡충증(<i>Microcotyle sebastis</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 1kg(억가 100g) 1일 1회, 3일 투여	100g /kg	㈜서울신약 조피볼락:15일	허가
	수산용 프라지시트 액 (프라지관텔)	○ 프라지관텔에 감수성이 있는 기생충성 질병 치료 -조피볼락:아가미흡충증(<i>Microcotyle sebastis</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 1~2L(억가 100~200g) 2일 간격, 1~3회 투여 ○ 약욕 -사육수 L 당 0.5~1L(억가 50~100g) 희석 후, 4분간 약욕	100g /L	㈜한동 조피볼락:10일	허가

다원 관텔 액 (프라지관텔)	○ 프라지관텔에 감수성이 있는 기생충성 질병 치료 -조피볼락:아가미흡충증(<i>Microcotyle sebastis</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 1-2L(역가 100-200g) 2일 간격, 1~3회 투여 ○ 약욕 -사육수 톤 당 0.5-1L(역가 50-100g) 희석 후, 4분간 약욕	100g(역가) /L	㈜다원케미칼 조피볼락:10일	변경
대성 아쿠아 포린 액 (포르말린)	○ 넙치:외부기생성 원충류 (<i>Ichthyobodo</i> sp., <i>Scuticociliatida</i>)의 구제 ○어란(무지개송어 및 연어):수생균 (<i>Saprolegnia</i> spp.)구제	○ 약욕 -넙치:100~200mL/물 톤, 1시간 약욕 (<i>Scuticociliatida</i> 감염의 경우 3-4일간 연속 투여) *배출기준:처리용수의 20배 이상 희석 배출 -어란(무지개송어 · 연어): 1,000~2,000mL/물 톤, 15분 약욕 *배출기준:처리용수의 200배 이상 희석 배출	999ml /L	㈜대성미생물연구소	변경
삼양 페반텔 산 (페반텔)	○ 페반텔에 감수성이 있는 기생충성 질병 치료 -조피볼락:아가미흡충증(<i>Microcotyle sebastis</i>) -복어류:아가미흡충증(<i>Heterobothrium okamotoi</i>)	○ 경구 -조피볼락:어체중 톤 당 0.5~1kg(역가 25-50g) 1일 1회, 5일 투여 -복어류:어체중 톤 당 0.25-0.5kg(역가 12.5-25g) 1일 1회, 5일 투여	50g /kg	㈜삼양애니팜 조피볼락:34일 복 어 류:21일	변경
삼양 페반텔 액 (페반텔)	○ 페반텔에 감수성이 있는 기생충성 질병 치료 -조피볼락:아가미흡충증(<i>Microcotyle sebastis</i>) -복어류:아가미흡충증(<i>Heterobothrium okamotoi</i>)	○ 경구 -조피볼락:어체중 톤 당 1-2L(역가 25-50g) 1일 1회, 5일 투여 -복어류:어체중 톤 당 0.5-1L(역가 12.5-25g) 1일 1회, 5일 투여	25g /L	㈜삼양애니팜 조피볼락:34일 복 어 류:21일	변경
스쿠말린 액 (포르말린)	○ 넙치:외부기생성 원충류 (<i>Ichthyobodo</i> sp., <i>Scuticociliatida</i>)의 구제 ○어란(무지개송어 및 연어):수생균 (<i>Saprolegnia</i> spp.)구제	○ 약욕 -넙치:100~200mL/물 톤, 1시간 약욕 (<i>Scuticociliatida</i> 감염의 경우 3-4일간 연속 투여) *배출기준:처리용수의 20배 이상 희석 배출 -어란(무지개송어 · 연어): 1,000~2,000mL/물 톤, 15분 약욕 *배출기준:처리용수의 200배 이상 희석 배출	999ml /L	㈜삼양애니팜	변경
스킬러 (포르말린)	○ 넙치: 외부기생성 원충류 (<i>Ichthyobodo</i> sp., <i>Scuticociliatida</i>)의 구제 ○어란(무지개송어 및 연어):수생균 (<i>Saprolegnia</i> spp.)구제	○ 약욕 -넙치:100~200mL/톤, 1시간 약욕 (<i>Scuticociliatida</i> 감염의 경우 3-4일간 연속 투여) *배출기준:처리용수의 20배 이상 희석 배출 -어란(무지개송어 · 연어): 1,000~2,000mL/톤, 15분 약욕 *배출기준:처리용수의 200배 이상 희석 배출	999ml /L	㈜참신희딩스	변경
아쿠아 마린 (포르말린)	○ 넙치:외부기생성 원충류 (<i>Ichthyobodo</i> sp., <i>Scuticociliatida</i>)의 구제 ○어란(무지개송어 및 연어):수생균 (<i>Saprolegnia</i> spp.)구제	○ 약욕 -넙치:100~200mL/물 톤, 1시간 약욕 (<i>Scuticociliatida</i> 감염의 경우 3-4일간 연속 투여) *배출기준:처리용수의 20배 이상 희석 배출 -어란(무지개송어 · 연어): 1,000~2,000mL/물 톤, 15분 약욕 *배출기준:처리용수의 200배 이상 희석 배출	999ml /L	녹십자수의약품(주)	변경
아쿠아하이드 (포르말린)	○ 넙치:외부기생성 원충류 (<i>Ichthyobodo</i> sp., <i>Scuticociliatida</i>)의 구제 ○어란(무지개송어 및 연어):수생균 (<i>Saprolegnia</i> spp.)구제	○ 약욕 -넙치:100~200mL/물 톤, 1시간 약욕 (<i>Scuticociliatida</i> 감염의 경우 3-4일간 연속 투여) *배출기준:처리용수의 20배 이상 희석 배출 -어란(무지개송어 · 연어): 1,000~2,000mL/물 톤, 15분 약욕 *배출기준:처리용수의 200배 이상 희석 배출	999ml /L	대한뉴팜(주)	변경

	파라스탑 (포르말린)	○ 넙치:외부기생성 원충류 (<i>Ichthyobodo</i> sp., <i>Scuticociliatida</i>)의 구제 ○ 어란(무지개송어 및 연어):수생균 (<i>Saprolegnia</i> spp.)구제	○ 약욕 -넙치:100~200mL/물 톤, 1시간 약욕 (<i>Scuticociliatida</i> 감염의 경우 3~4일간 연속 투여) *배출기준:처리용수의 20배 이상 희석 배출 -어란(무지개송어 · 연어): 1,000~2,000mL/물 톤, 15분 약욕 *배출기준:처리용수의 200배 이상 희석 배출	999ml /L	(주)한동	변경
	포름-에이 (포르말린)	○ 넙치:외부기생성 원충류 (<i>Ichthyobodo</i> sp., <i>Scuticociliatida</i>)의 구제 ○ 어란(무지개송어 및 연어):수생균 (<i>Saprolegnia</i> spp.)구제	○ 약욕 -넙치:100~200mL/물 톤, 1시간 약욕 (<i>Scuticociliatida</i> 감염의 경우 3~4일간 연속 투여) *배출기준:처리용수의 20배 이상 희석 배출 -어란(무지개송어 · 연어): 1,000~2,000mL/물 톤, 15분 약욕 *배출기준:처리용수의 200배 이상 희석 배출	999ml /L	(주)삼우메디안	변경
	피시마린 (포르말린)	○ 넙치:외부기생성 원충류 (<i>Ichthyobodo</i> sp., <i>Scuticociliatida</i>)의 구제 ○ 어란(무지개송어 및 연어):수생균 (<i>Saprolegnia</i> spp.)구제	○ 약욕 -넙치:100~200mL/물 톤, 1시간 약욕 (<i>Scuticociliatida</i> 감염의 경우 3~4일간 연속 투여) *배출기준:처리용수의 20배 이상 희석 배출 -어란(무지개송어 · 연어): 1,000~2,000mL/물 톤, 15분 약욕 *배출기준:처리용수의 200배 이상 희석 배출	999ml /L	이화팜텍(주)	변경
	수산용 유니- 알벤졸 액 (알벤다졸)	○ 알벤다졸에 감수성이 있는 기생충성 질병 치료 -조피볼락:아가미흡충증(<i>Microcotyle sebastis</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 0.25L(역가 25g) 1일 1회, 3일간 투여	100g /L	(주)유니바이오테크 조피볼락:최장 24일 (잠정적휴약기간)	조부 허가
	한동 알벤다졸 액 (알벤다졸)	○ 알벤다졸에 감수성이 있는 기생충성 질병 치료 -조피볼락:아가미흡충증(<i>Microcotyle sebastis</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 0.25L(역가 25g) 1일 1회, 3일간 투여	100g /L	(주)한동 조피볼락:최장 24일 (잠정적휴약기간)	조부 허가
백신	넙치 에드워드 백신	○ 넙치의 <i>Edwardsiella tarda</i> 에 의한 에드워드병 예방 목적	○ 주사 -넙치(체장 5~15cm):접종시 수온 18℃ 이상, 2주 간격 2회 침지	부표참조	녹십자수의약품(주)	변경
	넙치 연쇄구균 백신	○ 넙치의 <i>Streptococcus iniae</i> 에 의한 연쇄구균증 예방 목적	○ 주사 -넙치(평균체장 15cm이상):0.1mL씩 복강 1회 또는 2회 접종(2주 간격)	부표참조	녹십자수의약품(주)	변경
	뉴 포세이돈-5	○ 넙치의 비브리오병(<i>L. anguillarum</i> , <i>V. harveyi</i>), 연쇄구균증(<i>S. iniae</i> , <i>S. parauberis</i> Type 1), 에드워드병 (<i>E. tarda</i>) 예방 목적	○ 주사 -넙치(평균체장 10cm이상):0.1mL씩 가슴지느러미와 배지느러미 사이 복강 접종	부표참조	녹십자수의약품(주)	변경
	참신 하이파이브	○ 넙치의 비브리오 감염증(<i>V. harveyi</i>), 에드워드병(<i>Edwardsiella tarda</i>), 연쇄구균증(<i>Streptococcus iniae</i> , <i>Streptococcus parauberis</i> serotype 1a, 1b) 예방 목적	○ 주사 -넙치(평균체장 10cm이상):0.1mL씩 복강 1회 접종	부표참조	(주)중앙백신연구소	변경
	포세이돈-3	○ 넙치 연쇄구균증(<i>S. iniae</i> , <i>S. parauberis</i>), 에드워드병 (<i>E. tarda</i>) 예방 목적 * 면역지속기간: 16주	○ 주사 -넙치(평균체장 15cm이상):0.1mL씩 복강 1년마다 1회 접종	부표참조	녹십자수의약품(주)	변경
	포세이돈-5	○ 넙치 비브리오증(<i>L. anguillarum</i>), 활주세균증 (<i>T. maritimum</i>), 에드워드병(<i>E. tarda</i>), 연쇄구균증 (<i>S. iniae</i> , <i>S. parauberis</i> Type 1) 예방 목적 * 면역 지속기간: 4개월(16주)	○ 주사 -넙치(평균체장 15cm이상):0.1mL씩 가슴지느러미와 배지느러미 사이 복강 접종	부표참조	녹십자수의약품(주)	변경

대사· 소화기계 작용약	씨티씨백 노스트레스 (글루타치온 환원형 등)	○ 넙치의 스트레스 완화, 주사제(백신) 투여로 인한 채색 흑화 경감(투약 후 최장 4일까지)	○ 주사 -어체중 kg 당 0.1ml(글루타치온 10mg, 비타민 0.162mg) 1일 1회, 1일간 투여	부표참조	(주)씨티씨백 -	허가
	비타페롤 씨 (도코사헥사엔산 2배산 등)	○ 어류의 사료효율 개선, 성장촉진, 항병력증강, 황색지방증의 예방, 사료산화방지, 수정을 부화율의 향상, 등어웜병의 예방 및 치료	○ 경구 -사료에 본제 0.1~0.5% 비율로 혼합 연속 투여	250,000mg /kg	(주)삼우메디안	변경
	수산용 메타볼(주) (부타포스판 등)	○ 넙치의 증체개선, 성장촉진, 활력촉진, 스트레스 감소 및 면역증강	○ 주사 -어체중 kg 당 0.5ml 근육 주사	100mg /ml	우진비앤지(주)	변경
	수산용 아쿠아·씨 (L-Ascorbate -2-Monophosp hate(비타민C 로서))	○ 양식어류의 비타민 C 결핍증 예방 및 치료 ○ 항병력 강화, 면역력증강, 스트레스 감소	○ 경구 -치어·자어:사료 톤 당 1.6~2kg -육성어·성어:사료 톤 당 0.8~1.4kg -새우:사료 톤 당 3.6~4.8kg *균등히 혼합하여 투여하거나 적당량의 물에 용해하여 사료에 흡착시켜 투여	100g(역가) /kg	(주)한동	변경
	수산용 참신 리버웰 (글루타치온)	○ 어류의 산화지방으로 인한 성장을 저하 및 폐사율 증대의 예방 및 항병력 증진, 면역력 증강	○ 경구 -어체중 톤 당 본제 0.5~1kg 1일 양 혼합 투여	20g /kg	(주)참신홀딩스	변경
	아쿠아 비스라제 L 산 (리파아제 등)	○ 세균성 및 소화불량성 설사의 예방과 치료, 소화를 증진, 사료효율 개선, 성장촉진, 정장, 수질오염방지, 면역증강	○ 경구 -사료 톤 당 본제 1~5kg 혼합 투여	부표참조	(주)삼양애니팜	변경
소독제	이지워시 산 (차아염소산칼슘)	가. 본제에 감수성이 있는 병원체의 살멸 및 소독 ○ 세균: 일반세균(<i>Salmonella typhimurium</i>), 비브리오병(<i>Vibrio parahaemolyticus</i>), 연쇄상구균병(<i>Streptococcus parauberis</i>) ○ 바이러스: VHSV(<i>Viral hemorrhagic septicemia virus</i>) 나. 건조된 수조, 양식장 건조된 수조, 배관, 뜰채, 그물, 물차 등의 살균 및 소독	부표참조	70% /kg	대한뉴팜(주)	허가
	아쿠아- 팜세이프 (Didecyl dimethyl ammonium chloride)	가. 본제에 감수성이 있는 병원체의 살멸 및 소독 ○ 세균: 일반세균(<i>Salmonella typhimurium</i>), 비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>), 에드워드스병(<i>Edwardsiella ictaluri</i>), 연쇄구균병(<i>Streptococcus iniae</i> , <i>S. parauberis</i>), 새우 급성간체장괴사병(<i>Vibrio parahaemolyticus</i>) ○ 바이러스: VHSV(<i>Viral hemorrhagic septicemia virus</i>), 새우 흰반점바이러스병(<i>White spot syndrome virus</i> : WSSV) 나. 건조된 수조, 양식장 건조된 수조, 배관, 뜰채, 그물, 물차 등의 살균 및 소독	부표참조	50g /L	(주)우성양행	변경